

ตารางที่ 3 การสุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษารูปแบบการแพร่กระจายของแมลงศัตรูพืชและเพื่อประมาณประชากรแมลง(ต่อ)

พืช	แมลงศัตรู	รูปแบบการแพร่กระจาย	เนื้อที่สุ่มตัวอย่างเพื่อประมาณประชากร	ขนาดตัวอย่าง	หมายเหตุ
ส้มโอ	<ul style="list-style-type: none"> • หนอนชอนใบ • เพลี้ยไฟ 	แบบสุ่มและระเบียบ	Simple random	≥ 37 ใบ	ผิดจากค่าจริงร้อยละ 10 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
				≥ 28 ยอด	
				≥ 29 ดอก	
• ผลอ่อน	≥ 23 ผลอ่อน				
มะม่วงหิมพานต์	มวนชา	แบบกลุ่ม	สุ่มช่อดอกแบบ Simple random	60 ตัวอย่าง อย่างน้อย 5 ต้น	ผิดจากค่าจริงร้อยละ 40 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
โกโก้	มวนโกโก้	แบบกลุ่ม	Simple random	≥ 630 ผล / สวน	ผิดจากค่าจริงร้อยละ 40 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%